

Treść oznakowania produktu

MUCHO-MORD

Produkt owadobójczy w formie zawiesiny gotowej do użycia.

Produkt o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczony do zwalczania owadów latających i biegających w higienie sanitarnej

Zawartość substancji biologicznie czynnej: 0,3 g alfa-cypermetryny (związek z grupy pyretroidów) i 1,7 g chlorfenapyru w 1 litrze środka.

Pozwolenie nr**ZASTOSOWANIE:**

Mucho-Mord przeznaczony jest do zwalczania owadów w higienie sanitarnej: głównie much i komarów, ale także meszek, prusaków, karaluchów, pluskiew, mrówek faraona, rybików cukrowych itp.

Może być stosowany w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej, biurowych, fabrycznych, magazynowych, inwentarskich a także w szpitalach (z wyjątkiem sal chorych), przedszkolach i innych, przy ścisłym przestrzeganiu środków ostrożności.

Nie wolno opryskiwać żadnych produktów spożywczych składowanych luzem.

Zabiegów dezynsekcyjnych nie wolno w żadnym przypadku wykonywać w obecności chorych, dzieci, kobiet w ciąży, kobiet karmiących. Nie zaleca się stosowania preparatu w pomieszczeniach gdzie przebywają ludzie starsi oraz alergicy.

Produkt powoduje śmiertelność owadów biegających po upływie 1,5-4 godzin i owadów latających po upływie 20-40 minut od zastosowania

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem z preparatem. Dyszę opryskiwacza ustawić w odpowiedniej pozycji. Oprysk wykonać z odległości 20 – 30 cm tak, aby dokładnie pokryć preparatem powierzchnie, po których biegają szkodniki.

W przypadku zwalczania much opryskiwać należy powierzchnie, na których muchy przebywają najchętniej (nasłonecznione fragmenty ścian, framugi okienne i drzwiowe, okolice lamp, słupy nośne, przegrody, miejsca składowania odpadków - o ile nie są wykorzystywane jako karma dla zwierząt, itp.).

W przypadku zwalczania owadów biegających (prusaków, karaluchów itp.) szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca ich gnieźdzenia (naroża ścian i podłóg, szpary, szczeliny, przejścia rur i przewodów, miejsca za listwami, tapetami i wykładzinami, wannami, szafkami zlewozmywaków, tylne części mebli i obrazów, okapy itp.).

DAWKOWANIE:

Używać 50 ml preparatu na 1 m².

Jedno opakowanie (600 ml preparatu) wystarcza na opryskanie 12 m² powierzchni.

CZAS DZIAŁANIA:

Preparat działa przez okres kilku tygodni, w zależności od jakości wykonanego zabiegu, rodzaju opryskiwanej powierzchni, temperatury, wilgotności, zapylenia itp.

Na powierzchniach bielonych wapnem szybko ulega dezaktywacji.

Przestaje działać po umyciu, wytarciu, spłukaniu itp. opryskanej powierzchni.

PRZECHOWYWANIE:

S 47/49 - przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nieprzekraczającej 0-30⁰C,

S 7 - przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty,

Przechowywać w miejscach zaciemnionych. Nie dopuścić do przemarznięcia środka.

UWAGI:

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych
Wyrobków Medycznych
i Produktów Biobójczych
ul. Żąbkowska 41, 03-736 Warszawa
Regon: 015249601

1. Przed wykonaniem dezynsekcji na czas zabiegu usunąć z pomieszczenia ludzi i zwierzęta.
2. Nie stosować oprysku na żłoby, poidła i inne powierzchnie, z którymi mogą kontaktować się zwierzęta.
3. Chlewnie opryskiwać od wysokości 1,5 m a obory od wysokości 2 m od podłogi w górę.
4. Chronić przed skażeniem preparatem środki spożywcze, naczynia na żywność i paszę.
5. Przed wykonaniem dezynsekcji usunąć je z pomieszczenia lub dokładnie okryć.
6. Nie stosować oprysku na powierzchnie mające kontakt z żywnością.
7. Unikać przebywania w zasięgu rozpryskiwanej cieczy roboczej.
8. Unikać znoszenia preparatu przez przeciągi.
9. Nie opryskiwać łóżek i zabawek dziecięcych.
10. Nie opryskiwać części maszyn, instalacji, silników elektrycznych itp.
11. Obiekt może być oddany do użytku po całkowitym wyschnięciu opryskanych powierzchni i starannym przewietrzeniu.
12. Po pracy umyć dokładnie aparaturę, umyć się wodą i mydłem, wypłukać usta i zmienić odzież.
13. Opakowanie po opróżnieniu z preparatu należy przepłukać dwukrotnie niewielką ilością wody. Popłuczyny należy wypryskać na powierzchnię poddawaną zabiegowi dezynsekcji. Opakowania po produkcji nie zawierają pozostałości zagrażających środowisku i mogą być traktowane jak inne odpady, podlegające selektywnej zbiórce odpadów.
14. Produkt przeterminowany należy poddać utylizacji wg obowiązujących przepisów.

Środki ostrożności:

- S1/2 – Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
 S13 – Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
 S20/21 – Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
 S23 – Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej
 S 29 – nie wprowadzać do kanalizacji
 S36/37/39 – Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
 S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
 S27/28 – W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody i mydła,
 S46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

PIERWSZA POMOC:

Kontakt z oczami: Usunąć soczewki kontaktowe. Przemywać oczy dużą ilością wody przez ok. 15 minut, trzymając powieki szeroko rozwarte. Zgłosić się do okulisty.

Kontakt ze skórą: Miejscowe skażenie skóry, a zwłaszcza jej delikatnych obszarów, np. twarzy, może wywoływać swędzenie, pieczenie lub drętwienie. Natychmiast skórę zmyć dużą ilością wody z mydłem. Jeżeli wystąpią jakiegokolwiek podrażnienia skontaktować się z lekarzem.

Po połknięciu: W przypadku podejrzenia zatrucia natychmiast wezwać lekarza.

UWAGA! Osobie nieprzytomnej nie wolno nic podawać doustnie i nie wolno wywoływać wymiotów!

Wdychanie: Osobę wykazującą objawy zatrucia należy umieścić w dobrze wentylowanym miejscu lub na świeżym powietrzu. Należy zapobiec ewentualnemu wychłodzeniu ciała

Dostanie się do płuc, może spowodować objawy zapalenia płuc. Poszkodowanego należy umieścić w dobrze wentylowanym miejscu lub na świeżym powietrzu. Stosować leczenie objawowe.

Leczenie antyhistaminowe, jeżeli wystąpią objawy alergiczne.

W przypadku zatrucia, obserwuje się : nerwowość, objawy uczulenia, stany lękowe, mrowienie przy dotyku, bezład ruchowy (ataksja), drgawki.

Może powodować podrażnienie skóry i oczu.

W przypadkach, kiedy wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

Telefony ośrodków toksykologicznych w kraju:

Gdańsk – (058) 349-28-31, Kraków – (012) 411-99-99,

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych
 Wyrobów Medycznych
 i Produktów Biobójczych
 ul. Żąbkowska 41, 03-736 Warszawa
 Regon: 015249601

Poznań – (061) 847-69-46, Warszawa – (022) 619-66-54.

Podmiot odpowiedzialny i Producent:

ASPLANT-SKOTNICCY Sp. J.
43-600 Jaworzno, ul. Chopina 78A

tel/fax (032) 753-09-17, 753-09-33, 753-09-87

kom. 0601 911-741 www.asplant.com.pl

Data produkcji:

Nr partii produkcyjnej:

Termin ważności preparatu: 3 lata od daty produkcji

Zawartość opakowania:

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych
Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych
ul. Żąbkowska 41, 03-736 Warszawa
Regon: 015249601

PREZES
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Grzegorz Cessak

2013 -11- 0 6