

Biobeck PA 910

Pozwolenie Nr 0790/04

Preparat w postaci proszku do zwalczania ptaszyńca kurzego w kurnikach.

SUBSTANCJA CZYNNA:

Ditlenek krzemu (jako nanometariał w postaci agregatów i spieków) 100% (100g/100g)

PRZEZNACZENIE:

Zwalczanie ptaszyńca kurzego w budynkach inwentarskich.

ZASTOSOWANIE:

- Zabieg najlepiej przeprowadzić w godzinach rannych;
- Przed użyciem preparatu należy z budynku inwentarskiego usunąć obornik;
- Dokładnie oczyścić na sucho powierzchnie klatek, podłogi, ściany, itp. (np. przy pomocy sprężonego powietrza lub odkurzacza przemysłowego);
- w trakcie czyszczenia należy wyłączyć wentylatory;

UWAGA: Skuteczność zabiegu zależy od dokładności oczyszczenia obiektu.

- Rozprowadzić Biobeck PA 910 równomiernie za pomocą odpowiedniego aparatu rozpylającego np. pistoletu ssąco-rozpylającego lub aplikatora.
- Zabieg rozpoczynać w tylnej części budynku, przesuwając się wzdłuż przejścia.
- Strumień kierować głównie na miejsca przebywania ptaszyńca, jego kryjówki, miejsca spoczynku. W miarę możliwości nie kierować strumienia bezpośrednio na kury.
- Biobeck PA 910 powinien pokryć cienką warstwą możliwie wszystkie powierzchnie.

UWAGA : Preparat może być stosowany w obecności kur i jaj. Nie wymaga karencji.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA :

Dwutlenek krzemu jako składnik preparatu Biobeck PA 910 można traktować na stanowiskach roboczych jak każdy pył obojętny. Dla ochrony użytkownika przy rozprowadzaniu preparatu wystarczy filtr ochronny typu P1/P2. Dodatkowo zalecane jest standardowe ubranie ochronne, maskę przeciwpyłową oraz okulary ochronne.

DAWKOWANIE

Zależnie od wyposażenia, rodzaju budynku i stopnia porażenia zaleca się :

- ok. 10 kg Biobecku PA 910 w przeliczeniu na powierzchnię, którą zajmuje 10.000 ptaków,
- mniejsze ilości użytkowe można stosować w wentylowanych budynkach inwentarskich z transporterami taśmowymi do usuwania odchodów;
- w budynkach inwentarskich z urządzeniami do chowu podłogowego oraz przy chowie w wolierach ilość użytkowa na jeden zabieg wynosi 1 – 2 g na kurę.

Po pierwszym użyciu Biobecku PA 910 należy powtórzyć zabieg 6 – 8 razy w odstępach co 7 – 10 dni. Kolejne zabiegi zalecane są w przypadku ponownego porażenia roztocami jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

WARUNKI PRZECZOWYWANIA

Składować szczelnie zamknięty w suchym miejscu. Zabezpieczyć przed powstawaniem ładunków elektrostatycznych. Zapewnić wentylację magazynów.

PIERWSZA POMOC:

Wdychanie: Poszkodowane osoby wyprowadzić w razie potrzeby na świeże powietrze.

Kontakt ze skórą: Nie ma konieczności stosowania żadnych specjalnych zabiegów.

Kontakt z oczami: Słukać dokładnie oczy przy otwartych powiekach dużą ilością wody. W przypadku utrzymujących się dolegliwości – skonsultować się z okulistą. Połknięcie: Wyplukać jamę ustną wodą.

MOŻLIWE BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE SKUTKI UBOCZNE DLA ZDROWIA CZŁOWIEKA WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA PRODUKTU:

po wdychaniu: kaszel, kichanie.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI PRODUKTU I Z OPAKOWANIEM:

produkt i jego opakowanie nie są odpadami niebezpiecznymi, można usuwać je łącznie z odpadami komunalnymi.

Producent:

Biobeck Biologische Präparate
Im Freudental 11, D-59929 Brilon, Niemcy
Tel. 2963 1298 Fax 2963 908 458

Podmiot odpowiedzialny:

Agro – Trade Sp. z o.o.
Gowarzewo, ul. Akacjowa 3, 63-004 Tulce
Tel. 61 820 85 95, Fax. 61 820 86 70

Numer serii:

Data produkcji:

Trwałość : 3 lata od daty produkcji

Ilość produktu w opakowaniu:

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobow Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
NIP: 521-32-14-182 REGON: 015249601

z upoważnienia Prezesa
DYREKTOR
Departamentu Rejestracji i Oceny Dokumentacji
Produktów Biobójczych
A. Wilczyńska
Aleksandra Wilczyńska

2016 -05- 10