

TREŚĆ OZNAKOWANIA OPAKOWANIA

Podmiot odpowiedzialny: BASF Polska Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 142b, 02-305 Warszawa, tel.: 22 570 99 99, fax: 22 570 97 92, e-mail: poczta@basf.com

W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w treści oznakowania opakowania.

Mythic 10 SC

Koncentrat owadobójczy w postaci stężonej zawiesiny przeznaczony do zwalczania owadów biegających takich jak: pluskwa domowa, karaczan prusak, karaczan wschodni, przybyszka amerykańska, pchły, mrówki oraz owadów latających takich jak muchy. Do stosowania wewnątrz budynków.

Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania.

Zawartość substancji czynnej:
chlorfenapyr 106 g/l

Pozwolenie numer 5084/12 na obrót produktem biobójczym



NIEBEZPIECZEŃSTWO

H301 Działa toksycznie po połknięciu.

H317 Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H373 Może powodować uszkodzenie narządów (ośrodkowy układ nerwowy) poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102 Chronić przed dziećmi.

P260 Nie wdychać gazu, mgły, par.

P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

P271 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P273 Unikać uwolnienia do środowiska

P280 Stosować rękawice ochronne i odzież ochronną.

P391 Zebrać wyciek.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

W razie wypadku, złego samopoczucia lub zatrucia skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub z lekarzem.

ZAKRES STOSOWANIA I DAWKI

Preparat przeznaczony do zwalczania owadów biegających takich jak: pluskwa domowa, karaczan prusak, karaczan wschodni, przybyszka amerykańska, pchły, mrówki oraz owadów latających takich jak muchy. Preparat do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, w obiektach użyteczności publicznej takich jak: biura, przychodnie, szpitale (z wyłączeniem sal operacyjnych), szkoły, internaty, koszary wojskowe, ośrodki wczasowe, hotele, kawiarnie, restauracje, kina, teatry, sklepy, w magazynach (z wyjątkiem żywnościowych), w zakładach przemysłowych, w tym rolno-spożywczych, mięsnych oraz mleczarskich (z wyjątkiem strefy produkcyjnej), w pomieszczeniach inwentarskich, takich jak: chlewnie, obory i stajnie oraz na środkach transportu: na pokładach samolotów, na statkach, itp.

Chlorfenapyr należy do związków z grupy piroli, które zakłócają metabolizm energetyczny komórek. Preparat działa na owada od momentu spożycia preparatu lub kontaktu z nim. Pierwsze efekty owadobójcze widoczne są już w ciągu 24 godzin po zastosowaniu preparatu.

Zalecane stężenie preparatu: 1,6 % (80 ml preparatu w 5 l wody). W przypadku występowania dużej liczebności owadów albo oprysku powierzchni chłonnych lub zanieczyszczonych zwiększyć stężenie do 3,2 % (160 ml preparatu w 5 l wody). W przypadku zwalczania mrówek stosować stężenie 0,8 % (40 ml preparatu w 5 l wody). Tak przygotowane 5 l cieczy roboczej wystarcza na pokrycie 100 m² powierzchni (50 ml cieczy roboczej/m²).

SPOSÓB WYKONANIA ZABIEGU

Podczas przygotowywania odpowiedniego stężenia produktu oraz podczas jego stosowania operator musi nosić rękawiczki i maskę oddechową. Zabieg może być wykonany za pomocą większości typów opryskiwaczy dostosowanych do oprysku grubokroplistego pod niskim ciśnieniem. Wymieszać produkt z wodą w czystym pojemniku. Napełnić pojemnik z połową ilości zalecanej wody, dodać produkt, wymieszać i napełnić zbiornik resztą wody. Wstrząsnąć opryskiwaczem przed aplikacją i po ewentualnych przerwach w pracy. Produkt aplikować w szczelinach, pęknięciach oraz punktowo w miejscach gromadzenia się i na drodze przebiegu owadów.

W przypadku zwalczania karaczanów szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca gnieźdzenia się owadów (naroża ścian, szpary w podłodze, szczeliny w murze, zwłaszcza przejścia przewodów i rur, miejsca za listwami, tylne części mebli i obrazów, okapy). Wskazane jest również opryskiwanie miejsc składania odpadów (o ile nie są one wykorzystywane, jako karma dla zwierząt) oraz innych miejsc, w których wylęgają się owady.

Oczyszczyć sprzęt dokładnie po zastosowaniu. Nie nakładać na powierzchnie poddawane rutynowemu czyszczeniu na mokro. Pod koniec zabiegu wszelkie rozlania należy usunąć, a nadmiernie spryskane powierzchnie wyczyścić

jednorazowymi chusteczkami. Chusteczki należy usuwać jako odpady zgodnie z lokalnymi przepisami.

Szczegółowe wskazówki dotyczące stosowania podczas zwalczania pluskiew:

Przygotowanie do zabiegu powinno obejmować uporządkowanie przestrzeni, usunięcie miękkich tkanin oraz opróżnienie komody. Zarażone ubrania i pościel powinny być prane na gorąco i suszone w suszarce bębnowej, aby zabić pluskwy i ich jaja. Zastosowanie powinno obejmować pęknięcia i szczeliny wokół mebli, ram obrazów, listew przypodłogowych i tapet. W przypadku materacy nakładać tylko na szwy / krawędzie, nie na całą powierzchnię. Nie stosować na poduszkach, pościeli ani odzieży. Pozostaw do wyschnięcia przed ponownym ścieleniem łóżka.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C, z dala od źródeł ciepła.

Chronić przed dostępem wilgoci.

Chronić przed dziećmi.

Przechowywać pod zamknięciem.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA PREPARATU

Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą.

Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczoną odzież ochronną nie wynosić poza miejsce pracy, przed ponownym użyciem wyprać.

Dokładnie umyć zabrudzone części ciała po użyciu.

Unikać przebywania w zasięgu rozpryskiwanej cieczy użytkowej.

Nie stosować, kiedy ludzie i / lub zwierzęta są obecne.

Usuń zwierzęta domowe i przykryj lub usuń karmę dla zwierząt domowych / wodę i akwaria przed aplikacją.

Oczyścić wszelkie zanieczyszczenia z płynu, który pozostaje widoczny po aplikacji.

Pomieszczenie jest zdadne do użytkowania po wyschnięciu opryskanych powierzchni i starannym przewietrzeniu.

Pozamykać okna i drzwi celem uniknięcia znoszenia preparatu przez przeciągi.

Psy i inne zwierzęta domowe nie powinny przebywać we wcześniej opryskanych pomieszczeniach przez co najmniej 8 godzin.

Nie stosować preparatu na żłoby i poidła oraz inne powierzchnie, z którymi mogą mieć kontakt zwierzęta.

Nie stosować na żywności lub naczynia używane do gotowania.

Chronić środki spożywcze, naczynia na żywność i pasze przed opryskiem preparatem. Przed wykonaniem zabiegu trzeba je usunąć z pomieszczeń lub dokładnie okryć.

Nie stosować przy użyciu nebulizatora.

Produkt powinien być używany w przemyśle spożywczym w czasie, gdy cała żywność została usunięta z pomieszczeń.

Przewietrzyć pomieszczenie dokładnie przed wejściem.

Nie stosować w miejscach zabaw dla dzieci oraz w przedszkolach.

Nie opryskiwać łóżeczek dziecięcych, pościeli i zabawek.

Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia wylać z dala od zbiorników i ujęć wodnych.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI PRODUKTU I OPAKOWANIA

Produkt należy unieszkodliwić zgodnie z lokalnymi przepisami np. zdeponować na przystosowanym wysypisku lub dostarczyć do odpowiedniej spalarni.

Zabrania się spalania opakowań po preparacie we własnym zakresie.

Odpady zbierać oddzielnie w odpowiednich, oznakowanych i dających się zamknąć pojemnikach. Zabrudzone przedmioty i podłogę czyścić gruntownie wodą i środkami powierzchniowo-czynnymi z zachowaniem przepisów o ochronie środowiska.

Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania:

BRAK innych aniżeli wynikające z klasyfikacji.

PIERWSZA POMOC I INFORMACJA DLA LEKARZA

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnij porady/zgłoś się pod opiekę lekarza.

W przypadku zanieczyszczenia OCZU: płukać przez 15 minut pod bieżącą wodą przy szeroko otwartych oczach, konsultacje okulistyczne.

W PRZYPADKU POŁKNIECIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Wypłukać jamę ustną i wypić 200-300 ml wody, konsultacja lekarska.

W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.

Wskazówki dla lekarza:

- Postępowanie: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje vitalne).

Okres ważności – 3 lata od daty produkcji

Data produkcji:

Zawartość netto:

Nr serii:

Z upoważnienia Prezesa
Barbara Jaworska-Łuczak
Wiceprezes ds. produktów biobójczych
/dokument podpisany elektronicznie/