

PL

ZAŁĄCZNIK

Charakterystyka produktu biobójczego

Agita® 10WG

Grupa produktowa 18 – Insektycydy, akarycydy i produkty stosowane do zwalczania innych stawonogów (Zwalczanie szkodników)

Numer pozwolenia:

Numer zasobu w R4BP:

1. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1.1. Nazwa(-y) handlowa(-e) produktu

Nazwa handlowa	AGITA® 10WG
----------------	-------------

1.2. Posiadacz pozwolenia

Nazwa i adres posiadacza pozwolenia	Nazwa	
	Adres	
Numer pozwolenia		
Numer zasobu w R4BP		
Data udzielenia pozwolenia		
Data ważności pozwolenia		

1.3. Producent/producenti produktu

Nazwa producenta	Kwizda Agro GmbH,
Adres producenta	Werk Leobendorf B6 Laaer Straße, Kwizda-Allee 1., 2100 Leobendorf, Austria
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	Werk Leobendorf B6 Laaer Straße, Kwizda-Allee 1., 2100 Leobendorf, Austria

Nazwa producenta	Schirm GmbH,
Adres producenta	Dieselstraße 8., 85107 Baar-Ebenhausen, Niemcy
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	Dieselstraße 8., 85107 Baar-Ebenhausen, Niemcy

1.4. Producent (-ci) substancji czynnych

Substancja czynna	Tiametoksam
Nazwa producenta	Syngenta Crop Protection AG,
Adres producenta	-, CH-4002 Basel, Szwajcaria
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	Deccan Fine Chemicals (India) Private Limited Corlim, Illhas,, 403110 Goa Indie ESIM Chemicals GmbH, St-Peter-Strasse 25, 4020 Linz, Austria

Substancja czynna	Cis-trikoz-9-en (Muscalure)
Nazwa producenta	Denka International B.V.,
Adres producenta	Hanzeweg 1., 3771 Barnveld, Holandia
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	Hanzeweg 1., 3771 Barnveld, Holandia

2. SKŁAD I POSTAĆ UŻYTKOWA PRODUKTU

2.1. Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu produktu

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer WE	Zawartość (%)
Tiametoksam	thiamethoxam	Substancja czynna	153719-23-4	428-650-4	10,0
Cis-trikoz-9-en (Muscalure)	cis-Tricos-9-ene; (Z)-Tricos-9-ene	Substancja czynna	27519-02-4	248-505-7	0,05

2.2. Rodzaj postaci użytkowej

granulat do przygotowania roztworu wodnego

3. ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Działa drażniąco na oczy. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki .
Zwroty wskazujące środki ostrożności	W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich Unikać uwolnienia do środowiska. Zebrać wyciek. Usuwać zawartość do zgodnie z przepisami krajowymi.. Usuwać pojemnik do zgodnie z przepisami krajowymi.. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zebrać wyciek. Stosować odzież ochronną. Przechowywać pod zamknięciem.

4. ZASTOSOWANIE (ZASTOSOWANIA) OBJĘTE ZEZWOLENIEM

4.1. Opis użycia

Tabela 1. Zastosowanie # 1 – Zwalczanie muchy domowej wewnątrz budynków przez użytkownika profesjonalnego

Grupa produktowa	Gr. 18 - Insektycydy, akarycydy i produkty stosowane do zwalczania innych stawonogów
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)	Nazwa naukowa: Musca domestica Nazwa zwyczajowa: mucha domowa Etap rozwoju: Osobniki dorosłe

Obszar zastosowania	Wewnątrz Produkt do zwalczania muchy domowej (<i>Musca domestica</i>) wewnątrz pomieszczeń do hodowli zwierząt (w tym: stadniny, pomieszczenia dla drobiu, trzody chlewnej i bydła mlecznego). Produkt powinien być stosowany w pobliżu miejsc, gdzie zazwyczaj gromadzą się owady, takich jak: parapety, framugi sufitu, przegrody zagród i podłogi.
Sposób (-oby) nanoszenia	metoda: - Szczegółowy opis: Produkt do stosowania tylko na tablicach do wieszania w pomieszczeniach przeznaczonych do hodowli zwierząt. Stosować produkt w postaci roztworu poprzez naniesienie za pomocą pędzla/wałka na tablice zawieszane na ścianach. Produkt wykazuje skuteczność do 4 tygodni od zastosowania. Roztwór (100 g produktu rozpuszczonego w 80 ml wody) nanieść poprzez malowanie za pomocą pędzla/wałka na maksymalnie 10 tablic o wymiarach 20 cm x 30 cm każda. Tablice należy rozwiesić na ścianie o powierzchni 80-120 m². Produkt można zastosować ponownie w tym samym pomieszczeniu dopiero po 6 tygodniach od aplikacji. Nanieść ponownie roztwór, jeżeli tablice pokrył kurz lub przynęta została zjedzona przez owady.
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: maksymalnie 10 tablic o wymiarach 20 cm x 30 cm każda Rozcieńczenie (%): 100 g produktu rozpuszczonego w 80 ml wody Liczba i harmonogram aplikacji: Produkt można zastosować ponownie w tym samym pomieszczeniu dopiero po 6 tygodniach od aplikacji. Nanieść ponownie roztwór, jeżeli tablice pokrył kurz lub przynęta została zjedzona przez owady.

Kategoria (-e) użytkowników	Profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	1. Butelka (HDPE) o masie 100 g - 5 kg. 2. Saszetka laminowana (PET/Alu/PET/PE) z nadrukiem o masie 20 g pakowana po 25 sztuk, w sztywne pudełko typu dozownik (tektura).

4.1.1. *Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania*

-

4.1.2. *Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania*

-

4.1.3. *Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach*

-

4.1.4. *Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania*

-

4.1.5. *Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania*

-

5. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA¹

5.1. Instrukcje stosowania

- Przed zastosowaniem produktu należy przeczytać etykietę oraz postępować zgodnie z instrukcją.
- Produkt do stosowania przez użytkownika profesjonalnego wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
- Wymieszać wskazaną ilość produktu Agita® 10 WG w odpowiedniej objętości letniej wody w oddzielnym pojemniku. Użyć pojemnika o objętości, o 1/3 większej niż objętość potrzebnej wody i poczekać do czasu opadnięcia piany przed aplikacją produktu (za pomocą pędzla lub wałka). Tablice należy zawiesić na ścianach lub na suficie, w miejscach gromadzenia się owadów.
- Nie stosować produktu bezpośrednio na powierzchnie ścian budynku. Produkt musi być nakładany tylko na

¹ Instrukcje użytkowania, środki zmniejszające ryzyko oraz pozostałe wskazówki dotyczące stosowania na podstawie niniejszego punktu obowiązują w przypadku wszystkich zastosowań objętych pozwoleniem.

tablice do zawieszania, które nie wchłaniają produktu.

- Obszar, w którym odbywa się mieszanie i aplikacja produktu na tablice do zawieszania musi być przykryty jednorazową folią, aby uniknąć zanieczyszczenia sąsiednich powierzchni i podłogi.
- Nie czyścić tablic do zawieszania. Nie umieszczać tablic w miejscach poddawanych częstemu czyszczeniu.
- Usunąć wszystkie pokryte produktem biobójczym tablice przed czyszczeniem i/lub dezynfekcją pomieszczeń.
- Nie wolno czyścić sprzętu wykorzystanego do zastosowania produktu (pędzle, walki, tablice do zawieszania) po jego użyciu.
- Wszystkie zanieczyszczone urządzenia i sprzęt mogą być ponownie użyte bez czyszczenia.
- Produkt powinien być stosowany zgodnie ze zintegrowanym programem ochrony przed szkodnikami (IPM).
- Nie należy długoterminowo stosować produktu na danym terenie. Produkt należy stosować zamiennie z produktami, których skład jest oparty na substancjach czynnych z innej grupy chemicznej.
- Jeśli pomimo stosowania produktu, aktywność owadów nadal się utrzymuje, należy skonsultować się z wykwalifikowanym pracownikiem dezynsekcji i powiadomić posiadacza pozwolenia.

5.2. Środki zmniejszające ryzyko

- Produkt niebezpieczny dla pszczoł, zawiera tiametoksam.
- Produkt stosować w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania.
- Nie stosować produktu w miejscach, w których może on mieć kontakt z żywnością, wodą przeznaczoną do spożycia, paszą, przyborami mającymi kontakt z żywnością.
- Podczas sporządzania roztworu, mieszania i aplikacji produktu należy nosić jednorazowe ubranie ochronne (fartuch), w celu uniknięcia przedostania się do kanalizacji zanieczyszczonej wody w wyniku prania odzieży ochronnej.
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Po zastosowaniu produktu oraz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu umyć ręce i skórę narażoną na bezpośredni z nim kontakt.
- Przed zastosowaniem preparatu należy usunąć nieprzykryte pasze i środki spożywcze.
- Produkt wykazuje skuteczność do 4 tygodni od zastosowania. Produkt można zastosować ponownie w tym samym pomieszczeniu dopiero po 6 tygodniach od aplikacji.

5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Pierwsza pomoc:

Należy dostarczyć informacje personelowi medycznemu na temat produktu biobójczego, na którego działanie została narażona osoba poszkodowana, aby umożliwić personelowi medycznemu podjęcie odpowiednich środków ostrożności dla zapewnienia własnego bezpieczeństwa. Osobę narażoną na działanie produktu natychmiast przenieść ze strefy zagrożenia do wentylowanego pomieszczenia lub na świeże powietrze. Osobę taką należy chronić przed wychłodzeniem.

Inhalacja (wdychanie): natychmiast przemieścić na świeże powietrze. Zasięgnąć porady lekarskiej, jeżeli rozwiną się objawy lub gdy objawy będą się utrzymywały.

Kontakt ze skórą: zmyć wodą z mydłem. Zasięgnąć porady lekarskiej, jeżeli rozwiną się objawy podrażnienia lub gdy objawy będą się utrzymywały. Usunąć zanieczyszczoną odzież wraz z obuwiem i dokładnie przemyć wodą z mydłem te części ciała, które miały kontakt z preparatem.

Kontakt z oczami: płukać wodą. Zasięgnąć porady lekarskiej, jeżeli rozwiną się objawy podrażnienia lub gdy objawy będą się utrzymywały. Płukać oczy czystą wodą przez kilka minut.

Połknięcie: płukać usta. Zasięgnąć porady lekarskiej, jeżeli rozwiną się objawy. Po połknięciu zasięgnąć natychmiast porady lekarskiej i pokazać opakowanie lub etykietę. Nie jest znane specyficzne antidotum. Zastosować leczenie objawowe.

Skutki uboczne:

Nie są znane inne skutki niż wynikające z klasyfikacji produktu.

Środki ochrony środowiska:

Nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby, wody powierzchniowej i kanalizacji produktem lub opakowaniem po produkcie.

W przypadku niezamierzonego rozlania zahamować wyciek, jeżeli nie wiąże się to z ryzykiem dla pracownika. Rozlany preparat lub nadmiar preparatu zebrać używając chłonnego materiału np. papierowych ręczników, które następnie umieścić w odpowiednim pojemniku. Pozostałości zmyć wodą.

5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Zawartość usuwać zgodnie z przepisami krajowymi. Pozostałości zastosowanego produktu, wodę po myciu narzędzi oraz inne odpady (np. puste opakowania, zużyte kartony) należy usuwać zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi odpadów. Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych oraz nie usuwać do kanalizacji.

5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania. Przechowywać z dala od światła i wilgoci. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Długość okresu przechowywania: do 2 lat (od daty produkcji) w temperaturze poniżej 25°C.

6. INNE INFORMACJE

- Produkt zawiera czynnik zniechęcający do przypadkowego spożycia.
- Wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia w terminie do 3 lat od dnia dopuszczenia do obrotu produktu wyników badania trwałości produktu w czasie przechowywania w temperaturze otoczenia w opakowaniu handlowym, potwierdzających zachowanie właściwości fizycznych, chemicznych i technicznych

produktu przed i po okresie przechowywania.

- Monitorowanie możliwości występowania oporności powinno być prowadzone w sposób ciągły, a odpowiednie strategie kontroli oporności powinny być umieszczone na etykiecie w następujący sposób:
 - o Ten produkt nie powinien być używany w sposób ciągły przeciw muchom domowym w kontrolowanych pomieszczeniach dla zwierząt, ponieważ może to prowadzić do oporności na insektycydy, a w konsekwencji do braku skuteczności produktu.
 - o Tiametoksam, substancja czynna zawarta w produkcie AGITA® 10WG, należy do klasy neonikotynoidowych środków owadobójczych, o mechanizmie działania innym niż pozostałe klasy insektycydów, takich jak pyretroidy i związki fosforoorganiczne.
 - o Zastosowanie zawieszek (tablic do zawieszania) zapewnia, że większość pomieszczeń dla zwierząt nie stwarza ryzyka kontaktu ze zbyt małą (subletalną) dawką produktu. Niemniej jednak, aby zminimalizować możliwość rozwoju oporności w przyszłości, zaleca się unikanie stosowania AGITA® 10WG w sposób ciągły, i jako jedyny środek do kontroli much.
 - o Produkt AGITA® 10WG powinien być wykorzystywany, jako jeden z elementów zintegrowanego programu ochrony przed szkodnikami, który obejmuje produkty z różnych klas chemicznych oraz środki niechemiczne (np. moskitiery, praktyki sanitarne).
 - o Produkt szkodliwy dla pszczoł.

UFI: 9G30-81P4-P00M-7KHV