

Podmiot odpowiedzialny: Bleu Line s.r.l., Forlì (FO) Via Virgilio 28, CAP 47122, Frazione Villanova Zona Ind., Włochy, tel. +39 0543 754430 , Fax +39 0543 754162 , e-mail: bleuline@bleuline.it

CIPEXEN 10

Płyn, koncentrat do sporządzania emulsji wodnej. Przeznaczony do zwalczania owadów latających (np. much, komarów, komarów tygrysich) i biegających (np. mrówek, karaczanów), które występują powszechnie w obiektach mieszkalnych, przemysłowych i na terenach przyległych tj. na tarasach, chodnikach parkingach, placach o utwardzonej powierzchni.

<u>Skład</u> 100 g skład produktu Substancja czynna: Cypermetryna (CAS 52315-07-8) 10 g/100 g Koformulanty do 100 g	
  Uwaga	H373 Może powodować uszkodzenie narządów (układ nerwowy) poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy. P391 Zebrać wyciek. P501 Zawartość/pojemniki należy utylizować w punktach zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.
Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 8092/20 Nr partii/ data produkcji: Okres ważności: 24 miesiące od daty produkcji	
Zawartość netto:	

Przechowywanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych pojemnikach. Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, w temperaturze od 5°C do 30°C. Chronić przed dostępem dzieci i zwierząt. Przechowywać z dala od żywności.

ZASTOSOWANIE

Produkt zawiera cypermetrynę, substancję czynną, która działa zarówno przez kontakt, jak i przez spożycie. Może być stosowany wewnątrz i na terenach przyległych do domów, magazynów, szkół, szpitali, kin, sklepów, budynków przemysłu spożywczego, pustych młynów, zakładów paszowych (pod warunkiem braku żywności), hoteli, restauracji, stołówek, ośrodków turystycznych, a także środków transportu, czy wszelkich budynków inwentarskich i gospodarczych. Poprzez zawartość cypermetryny, następuje efekt działania: wykazuje skuteczność po upływie 2 godzin od momentu zastosowania, skuteczność utrzymuje się do 4 tygodni od momentu zastosowania. Formulacja jest skoncentrowaną emulsją, bez lotnych związków organicznych.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Rozcieńczyć produkt w wodzie w podanych poniżej dawkach i równomiernie rozprowadzić emulsję uzyskaną na powierzchniach, w których przebywają owady.

Pomieszczenie, w którym będzie wykonywany zabieg należy odpowiednio przygotować: wyprowadzić zwierzęta, zabezpieczyć akwaria i terraria, artykuły spożywcze oraz wszelkie przedmioty codziennego użytku. W przypadku usunięcia produktu z miejsca zastosowania (np. opady atmosferyczne) zabieg należy powtórzyć.

Produkt przeznaczony jest do powszechnego stosowania.

Właściwości fizykochemiczne preparatu umożliwiają stosowanie go z wykorzystaniem nebulizatorów. Stosowanie nebulizatorów ULV wyłącznie przez profesjonalistów

Zalecane dawki:

- przeciw muchom: dawka: 80 g/m² stężenie 1%
- przeciw komarom i komarom tygrysim: dawka 30 g/m² stężenie 1%
- przeciw karaczanom: dawka 50 g/m² stężenie 1%
- przeciw mrówkom: dawka 50 g/m² stężenie 1%
- *Culex pipines* – nebulizacja pomieszczenia 10 minut: 30m³ skuteczność po 20 minutach od zastosowania. Dawka 100g/30m³ stężenie: 0,5%
- *Aedes albopictus*- nebulizacja pomieszczenia 11 minut: 30m³ skuteczność po 20 minutach od zastosowania. Dawka 100g/30m³ stężenie: 0,65%

Stosowanie nebulizatorów ULV wyłącznie przez profesjonalistów.

Jeśli powierzchnie są bardzo chłonne, wykonaj drugi zabieg.

Środki ostrożności:

- Nie używać jako koncentratu: postępować zgodnie z instrukcjami.
- Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
- Podczas stosowania nie zanieczyszczać żywności, napojów lub pojemników na żywność, sprzętów kuchennych - przechowywać z dala od żywności i napojów.
- Przed opryskiwaniem należy usunąć z pomieszczenia ludzi, zwierzęta, rośliny, nieopakowane produkty spożywcze, pasze, naczynia kuchenne i stołowe oraz zabawki.
- Nie rozpylać w powietrzu, stosowanie nebulizatorów wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych.
- Po użyciu lub w przypadku zanieczyszczenia dokładnie umyć wodą z mydłem twarz i ręce.
- Nie zanieczyszczać preparatem zbiorników i ujęć wodnych.

- Niezwykle niebezpieczne dla ryb. Nie zanieczyszczać jezior, rzek ani cieków wodnych produktami lub pojemnikiem. Chronić akwaria przed działaniem produktu.
- Nie stosować w rolnictwie.

Pierwsza pomoc

Narażenie inhalacyjne - usunąć poszkodowanego z zasięgu narażenia, zapewnić mu dostęp świeżego powietrza i spoczynek. W przypadku trudności z oddychaniem, zapewnić natychmiast pomoc medyczną.

Skażenie skóry - zdjąć całą skażoną odzież. Obmyć skórę dużą ilością wody. Jeśli skażenie się utrzymuje, zasięgnąć pomocy medycznej. Skażoną odzież należy uprać przed ponownym założeniem.

Skażenie oka – zdjąć soczewki kontaktowe, jeśli są obecne. Przepływać dużą ilością wody, utrzymując powieki otwarte, przez co najmniej 15 minut. Jeśli problem się utrzymuje, zasięgnąć porady medycznej.

Po spożyciu – zasięgnąć pomocy medycznej. Wywoływanie wymiotów możliwe jest tylko na wyraźne zalecenie i pod kontrolą lekarza. Nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej, dopóki nie zaleci tego lekarz.

Postępowanie z odpadami produktu:

Użyć ponownie, jeśli to możliwe. Pozostałości produktu należy uznać za odpady niebezpieczne. Utylizacja musi być przeprowadzona przez autoryzowany zakład zajmujący się gospodarką odpadami, zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami. W przypadku wycieku, zebrać rozlany produkt i umieścić w odpowiednim pojemniku. Pozostałości produktu zabsorbować nieaktywnym materiałem. Wywietrzyć skażone pomieszczenia.

Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcji:

Zanieczyszczone opakowanie należy usunąć zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Pustego opakowanie nie należy usuwać do środowiska.